



懷孕期間的危險徵兆



懷孕期間的危險徵兆

你應該牢記

以下是一些在懷孕期間你應該加以注意的危險徵兆和癢狀。

當以下任何危險徵兆出現在你身上時，立即和你的醫生聯繫。如果無法及時取得聯繫，你應馬上到你計劃生產的醫院急診室去，或者撥打911求助。

- 發冷，發燒至101華氏度或以上。
- 突發的、劇烈的或持續的下腹部疼痛。
- 持續嘔吐、噁心或腹瀉。
- 陰道大出血。
- 眼前出現黑點，視力模糊，劇烈頭痛，臉和手突然腫脹，體重猛然上升。
- 在預產期前出現強烈、有規律的宮縮（1小時內4次或以上）。
- 陰道內突然流出羊水。
- 在懷孕20周以後，胎兒一天內都沒有胎動；或在懷孕28周以後，胎兒在兩小時內胎動少於10次。



你應該牢記

當出現以下危險徵兆和癢狀時，你應該提高警惕。

如果出現以下情況，請立即和你的醫生聯繫：

- 小便時感覺刺痛。
- 臉、手和腳都腫脹。
- 突然感覺口渴，但小便不多，甚至根本沒有小便。
- 乳頭或身體的其他部位出血；發現小便或大便中有血。
- 嚴重便秘。
- 陰道發癢或有灼傷感，以及出現不正常的陰道分泌物。
- 生殖器上生瘡或者水疱。

當你出現任何疼痛或不舒服的癢狀，請立即和你的醫生聯繫。