

針吸乳房活組織檢查 你應該知道些什麼

什麼是針吸活組織檢查？

針吸活組織檢查是最快和最容易進行的一種乳房活組織檢查。這種方法是用一根細針從乳房硬塊抽取細胞或液體樣本，這樣本將放在顯微鏡下查看是否有不正常的細胞、病變的徵兆、癌細胞或感染。

你應該知道些什麼？

檢查前


1. 如果你正在服用阿士匹林或其他稀釋血液的藥物，請告訴你的醫生
2. 在接受活組織檢查當日：
 - 不要吃得太飽
 - 穿著舒適的上下身分開的服裝（勿穿連衫裙或褲）
 - 不要在乳房和腋下塗潤膚乳、除體臭粉或香水

檢查的程序

- 醫生會指導你坐着或躺着的姿勢，以便查找乳房硬塊的位置。
- 乳房的皮膚會清潔消毒，穿刺的部位將會局部麻醉。
- 皮膚被麻醉後，醫生會用一根細針刺入皮膚，並抽取活組織或液體進行化驗。
- 如醫生摸不到乳房的硬塊，可能要用超聲波或電腦掃描來尋找穿刺位置。

檢查後的情況

在穿刺的位置貼上膠布。只有少數人的乳房會感到敏感和出現瘀塊。但大部分人在接受針吸活組織檢查後都能恢復日常活動。



Source: National Cancer Institute
資料來源：美國國家癌症研究所

常見的疑問

檢查需多久？

一般針吸活組織檢查只需要幾分鐘。如需要做超聲波或電腦掃描，則需要大約30至90分鐘。通常在檢查後7至10日可取得檢查報告。

會感到疼痛嗎？

在檢查中你可能會沒有感覺、也可能會感到被捏或有壓迫感。少數人的乳房會感到敏感和出現瘀塊，這些情況可以用冰敷來舒緩。如果你在檢查過程中或檢查結束後感到疼痛，請立即告訴你的醫生。

會引起併發症嗎？

因針吸活組織檢查而引發併發症的情況非常罕見。最常見的問題是被穿刺的部位出血，通常用按住出血的部位來止血，並貼上膠布。這種檢查方法導致癌細胞擴散的可能性很低，甚至十分罕見。