

宮頸環形電切術 (LEEP)

宮頸環形電切術 (LEEP) 是用於診斷及治療子宮頸不正常的細胞。它可以切除子宮頸不正常的組織。被切除的組織送到實驗室做化驗。

宮頸環形電切術可在醫生的醫務所、診所或醫院進行，通常只要10至15分鐘。宮頸環形電切術應在非經期時進行。



在進行宮頸環形電切術時

1. 你要平躺在檢查台上，醫生會將陰道窺鏡插入到你的陰道裏，達至你的子宮頸。然後注射麻醉劑麻痹你的子宮頸。
2. 醫生會使用電熱的環形線圈，從你的子宮頸上切下不正常組織的薄片。
3. 切下來的組織將會送到實驗室作進一步的化驗。
4. 醫生會為你塗上一種特別的藥膏以防出血或止血。

做完環形電切術後

你可能會在幾個小時內感到輕微的腹痛，並且大約在3週內出現深棕色的陰道分泌物或少量的陰道出血。

不要...

- 在術後3週內使用衛生棉條。
- 在術後3週內進行性交。
- 在術後4週內沖洗陰道。
- 在術後2-3天內抬舉重物。

可能出現的風險

完成宮頸環形電切術後，可能會出現併發症，包括子宮頸感染、出血或有傷疤。

這也會稍微增加早產或嬰兒出生體重偏低的風險。

如果你的身體出現特殊的健康狀況，你應在進行手術前預先告知你的醫生。如果你懷孕了或認為自己可能有身孕，你也要告訴你的醫生。

如果你在宮頸環形電切術後出現下述任何症狀，請儘快致電給你的醫生：

- 劇烈腹痛
- 發燒或發冷
- 陰道分泌物出現惡臭
- 陰道大量出血

在宮頸環形電切術後復診

你的復診時間是根據切除組織的化驗結果而定。你的醫生將會告知你何時以及隔多久要做子宮頸抹片檢查（子宮頸癌的測試）。此次檢查是為了確保所有不正常的細胞都被切除。



CHARLES B. WANG
COMMUNITY HEALTH CENTER
王嘉廉社區醫療中心

諮詢熱線 (212) 226-8339

網址 www.cbwchc.org

268 Canal Street, New York, NY 10013

內科部 (212) 379-6998

婦產科部 (212) 966-0228

125 Walker Street, 2/F, New York, NY 10013

兒科 (212) 226-3888

青少年資源中心 (212) 226-2044

牙科部 (212) 226-9339

136-26 37th Avenue, Flushing, NY 11354

內科部 (718) 886-1200

婦產科部 (718) 886-1287

兒科部 (718) 886-1222

137-43 45th Avenue, Flushing, NY 11355

內科、兒科、婦科及家庭全科 (929) 362-3006

健康教育部 (212) 966-0461

社工部

曼哈頓 (212) 226-1661

皇后區 (718) 886-1212

協助申請健保

曼哈頓 (212) 226-8339

皇后區 (718) 886-7355